

ЗачеМ

нужно сдавать тест на ВИЧ?

- выяснить причину плохого самочувствия и/или получить информацию о состоянии своего здоровья;
- не поставить в опасность заражения близкого человека;
- снять тревогу, когда человек понял, что в его жизни был риск заражения ВИЧ;
- подать пример своему партнеру, который пока не готов обследоваться;
- подготовиться к наступлению беременности;
- своевременно начать лечение, если ВИЧ-инфекция будет обнаружена.

КАЖДЫЙ, включая тебя, подвергается всевозрастающему риску заражения ВИЧ!

Получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ можно по адресу:

г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 62
тел.: 8 (983) 350-05-84

филиал г. Бийск,
ул. Горно-Алтайская, 66
тел.: 8 (3854) 44-78-72

филиал г. Заринск,
ул. Больничная, 20
тел.: 8 (963) 533-61-99

филиал г. Славгород, ул. Ленина, 288
тел.: 8 (3856) 85-39-95

филиал г. Рубцовск, ул. Алтайская, 94
тел.: 8 (3855) 75-86-93

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И КАБИНЕТА

по экспресс-тестированию
на ВИЧ-инфекцию можно найти
на нашем сайте <https://altaids22.ru/>

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:



vk



tg



ok



+18

Знаю

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и снижает способность организма противостоять возбудителям болезней.

Большинство людей - носителей ВИЧ - выглядят здоровыми и чувствуют себя хорошо в течение нескольких лет, но при этом передают вирус другим.

ВИЧ не устойчив во внешней среде, поэтому может передаваться только через биологические жидкости человека, содержащие вирус.

Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?



Через кровь

- при использовании нестерильных шприцев и игл для внутривенного введения наркотиков;
- при использовании нестерильных хирургических инструментов, шприцев, игл и тд.;
- при переливании инфицированной крови и ее компонентов, а также при пересадке инфицированных донорских органов.



Половым путем

- при незащищенных сексуальных контактах (без использования презерватива) через сперму и влагалищные выделения.



От матери к ребенку

- во время беременности, при прохождении через родовые пути, при кормлении грудью.

Правильное использование презерватива - надежный способ защитить себя и партнера от передачи ВИЧ-инфекции!

СПИД

синдром приобретенного иммунодефицита человека, последняя стадия ВИЧ-инфекции.

Иммунная система сильно повреждена вирусом и уже не выполняет своих защитных функций.

Организм теряет способность противостоять бактериям, вирусам и грибкам, вызывающим различные болезни на фоне снижения иммунитета.

ВИЧ не передается:

- через слюну, слёзы, пот, мочу, мокроту;
- пользование бытовыми предметами, посудой, одеждой;
- совместное потребление пищи;
- посещение общественных туалетов, бань, бассейнов;
- при рукопожатии, объятиях и других прикосновениях друг к другу;
- на учёбе (при совместном использовании телефоном, компьютером и пр.);
- при укусах насекомых и животных.

Есть вирус в организме или нет может показать только **лабораторный анализ** крови на ВИЧ-инфекцию!
Определить ВИЧ по внешним признакам невозможно.

Первый раз необходимо сдавать анализ **через 3 недели** после рискованной ситуации в плане заражения ВИЧ.

«Период окна» (длится от 3-х недель до 3-х месяцев) - период, когда вирус в организме уже есть, но антитела ещё не образовались в достаточном количестве и определить инфекцию невозможно.
В этот период инфицированный человек уже может передать ВИЧ другим людям.

результаты

- **положительный результат анализа** указывает, что в организме человека присутствуют антитела к вирусу иммунодефицита человека.

Антитела - это белки, которые вырабатываются в ответ на попадание вируса в кровь.

- **отрицательный результат анализа** не исключает заражения, а лишь свидетельствует о том, что в момент обследования в крови не было антител (так называемый «период окна»).

Поэтому при отрицательном результате анализа его рекомендуется повторить еще раз **через 3 месяца**.
Если за это время других опасных ситуаций не было и тестирование не определило антител к ВИЧ, значит, человек не инфицирован.

Как защитить себя от ВИЧ-инфекции?

- избегать случайных половых связей;
- использовать презерватив при каждом половом контакте;
- не употреблять наркотики;
- делать пирсинг и татуировки только в специализированных учреждениях;
- регулярно проходить тестирование на ВИЧ;
- владеть достоверной информацией о профилактике заболевания.